

Avertissements agricoles

ISSN : 0980-9384
DLP-9-8-88017 24

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

GRANDES CULTURES

7 - du 3 AOUT 1988

MAIS

(en collaboration avec les SUAD de l'HERAULT,
du GARD et du SPMS de l'HERAULT)

PYRALE-SESAMIE : Traitement contre la deuxième génération

Pyrale et Sesamie

Le deuxième vol de pyrale a débuté vers les 18 à 20 juillet. Les pontes de 2ème génération de Sésamie vont être déposées.

MAIS-SEMENCE

En fonction des zones de culture un ou deux traitements seront à effectuer :

* Deux traitements sont à prévoir en zones sensibles. Ce sont celles qui ont subi de fortes attaques de pyrale ou de sésamie en première génération. Intervenez aux dates suivantes :

- premier traitement à effectuer vers les 3 à 5 AOUT
- deuxième à réaliser 15 jours plus tard.

* Un seul traitement en zones peu sensibles. Il sera réalisé vers les 8 à 10 AOUT.

MAIS-CONSOMMATION

Un seul traitement à réaliser vers les 8 à 10 AOUT, surtout en présence de sésamie en première génération.

.../...

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



pucerons

Ils sont peu présents sauf localement. Surveillez les parcelles ayant reçu un traitement 1ère génération pyrale ou sésamie avec spécialités liquides.

acarïens

Ces ravageurs sont beaucoup moins actifs qu'en 1987. Le maïs étant toujours en période de forte sensibilité, il convient cependant de continuer la surveillance et d'intervenir si nécessaire selon les indications fournies dans le bulletin du 13 juin 1988

